

WONDBEHANDELING



Post-operatieve wondbehandeling



Unguis incarnatus

Als gevolg van het niet optimaal functioneren van de voeten of het dragen van slecht passend schoeisel of een combinatie hiervan kan er een wond op de voet, enkels of digiti ontstaan. Een groot risico voor het ontstaan van een wond is sensibele, motorische of autonome neuropathie en/of slechte bloedvaten. Het is van belang dat de oorzaak waardoor de wond is ontstaan wordt achterhaald en wordt aangepakt. Daarnaast moet de wond goed verzorgd worden om infecties te voorkomen en de genezing zo goed mogelijk te laten verlopen.

INSTRUMENTELE BEHANDELING BIJ WONDEN

Voetwonden kunnen slecht genezen als wondbeslag of callusvorming de genezing tegenhoudt. Door middel van een instrumentele behandeling kan de podotherapeut onrechtmatigheden verwijderen.

Drukverdelende therapie bij wonden

Ook voeten met een wond worden doorgaans veel belast. Om de druk zo veel mogelijk van de wond af te halen wordt de wond drukvrij gelegd met een verbandtherapie van vilt. Daarnaast wordt er zo nodig een schoenmodificatie toegepast, een schoenadvies gegeven of een andere drukverdelende therapie toegepast.

Overige therapieën bij wonden

Wanneer een podotherapeutische behandeling alleen niet meer toereikend is, dan wordt er contact opgenomen met de huisarts om te bespreken wat vervolgstappen kunnen zijn. Voor de hand liggende acties zijn het leveren van verbandschoenen of voorlopig orthopedisch schoeisel door de orthopedisch schoenmaker, het voorschrijven van een antibioticum door een (huis)arts en/of het verwijzen van de patiënt naar een tweedelijns voetenpoli.